



1

Esquema Primario y Refuerzos
en población sana

Y entonces... ¿Cómo quedamos con las Vacunas COVID 19?

La evidencia frente a las vacunas contra la **COVID 19** es dinámica y desde el Ministerio de Salud y Protección Social y organizaciones científicas reconocidas se mantiene una actualización continua.

Te presentamos como quedamos
en el **esquema contra COVID 19**
en Colombia.

Se administrarán con los biológicos disponibles en cada territorio de acuerdo a la asignación inicial.

Grupo poblacional	Primera dosis Biológico	Segunda dosis Biológico	Primer Refuerzo Biológico	Segundo Refuerzo Biológico
6 meses a 2 años	Moderna Pedátrica (0,25 mL)	Moderna Pedátrica (0,25 mL)		
3 a 5 años	Sinovac (0,5 mL)	Sinovac (0,5 mL)	No Aplica	No Aplica
6 a 11 años	Sinovac (0,5 mL)	Sinovac (0,5 mL)		
12 a 17 años	Sinovac (0,5 mL)	Sinovac (0,5 mL)	Solo en grupos priorizados	No Aplica
	Sinovac (0,5 mL)	Sinovac (0,5 mL)	Sinovac (0,5 mL)	
18 años y más	Pfizer (0,3 mL)*	Janssen (0,5mL)	Janssen (0,5mL)	
	Moderna (0,5mL)*			Solo en grupos priorizados
	Janssen (0,5mL)	Janssen (0,5mL)		

* Solo si corresponde a la primera dosis ya aplicada

Coadministración

Se deben aplicar los biológicos COVID de manera simultanea con los biológicos de esquema permanente el mismo dia o con cualquier intervalo

Fuente: Resolución 986 de 2023

Versión 02/08/2023

Debes estar pendiente a próximas actualizaciones

2



Observaciones para aplicación de



Dosis Adicional

Sin antecedente vacunal: A partir de la semana 12 se aplicarán dos dosis de vacuna Pfizer con intervalo de 21 días, y hasta una dosis adicional a los 6 meses de la segunda dosis, si alcanza el periodo de gestación y postparto (40 días).

Antecedente vacunal incompleto (1 dosis): deben recibir la dosis que corresponda a partir de la semana 12 de gestación y hasta una dosis adicional a los 6 meses de la segunda dosis, si alcanza el periodo de gestación y postparto (40 días).

Con esquema primario completo (2 dosis): A los 6 meses después de la aplicación de la segunda dosis. Se debe garantizar una dosis por cada embarazo.

Esquema primario completo (2 dosis) y un primer o segundo refuerzo: A los 6 meses de la aplicación del primer o segundo refuerzo antes del embarazo actual, se aplicará una dosis adicional.

12 meses después de su última dosis (Esquema primario y/o refuerzos).

6 meses después de su última dosis (Esquema primario y/o refuerzos).

12 meses después de su última dosis (Esquema primario y/o refuerzos).

Priorizados para una dosis adicional con un intervalo de 8 semanas una vez completado el esquema primario y 2 refuerzos con intervalo de 4 meses cada uno.

Una vez realizado el trasplante, debe reiniciar el esquema primario de vacunación y refuerzos contra la COVID-19. Se recomienda con vacuna de plataforma RNA mensajero (Pfizer o Moderna).

3

Reinicio de esquemas

Trasplantados Medula Ósea

RNA mensajero

Moderna pediátrica solo se podrá usar en población de 6 meses a 2 años, 11 meses, 29 días, con intervalo de 28 días Interdosis, garantizando la segunda dosis.

Pfizer solo se podrá usar para dosis adicionales de población prioritizada, en reinicio de esquemas por trasplante de medula ósea, en inmunosuprimidos y Gestantes sin antecedente vacunal o antecedente incompleto.

Personas inmunosuprimidas mayores de 18 años, que recibieron una dosis de vacuna de Janssen, deben recibir una segunda dosis de Janssen o vacuna de ARNm a las 4 semanas después de la inicial, recibir un refuerzo con vacuna de ARNm al menos 2 meses después de la segunda dosis y un segundo refuerzo con vacuna de ARNm al menos 4 meses primer refuerzo. (Debe recibir al menos 4 dosis de vacuna COVID-19). Este grupo tiene priorizada la dosis adicional

En PAIWEB se habilita en esquema PAI ADICIONAL- SIN RANGO DE EDAD el registro de MODERNA PEDIATRICA (primera y segunda) y PFIZER ADICIONAL; como se manejan dosis de 0,25mL no será necesario trabajar con unidades.

iA VacunArte!...